

## くすりのしおり

620006795

2008年7月改訂

内服剤

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**商品名：アログリセムカプセル 25mg**

主成分：ジアゾキシド（Diazoxide）

剤形：硬カプセル剤（キャップ・ボディ：無色透明，内容物：白色粉末）  
（号数3号，長径15.8mm）

シート記載：表；アログリセムカプセル 25mg 951裏；アログリセムカプセル 25mg

**この薬の作用と効果について**

インスリン分泌を抑制することにより血糖を上昇させます。

**次のような方は、使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。**

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ チアジド系利尿剤に対して過敏症のアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 心臓疾患、高尿酸血症、痛風、腎障害がある。
- ・ 妊娠または授乳中。
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

**用法・用量（この薬の使い方）**

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> **：医療担当者記入**

- ・ 1歳以上の幼小児及び成人：

ジアゾキシドとして1日3～8mg/kgを2,3回に分割し、8あるいは12時間ごとに服用。

ただし、服用開始時は1日3～5mg/kgを2,3回に分割して服用。

- ・ 1歳未満の乳児：

ジアゾキシドとして1日8～15mg/kgを2,3回に分割し、8あるいは12時間ごとに服用。

ただし、服用開始時は1日5～10mg/kgを2,3回に分割して服用。

いずれの場合でも、血糖値に応じ適宜増減されますが、1日最大服用量は20mg/kgまでです。

必ず指示された服用方法に従ってください。

- ・ 飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

**生活上の注意****この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、多毛、肝機能障害、吐き気、嘔吐、不快感、血小板増多などが報告されています。

このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

**まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。****このような場合には使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。**

- ・ 胸水・心嚢液・腹水など体腔に液体が貯留した状態〔体液貯留〕
- ・ 心機能が低下し血液が停留した状態 呼吸困難、全身のむくみ〔うっ血性心不全〕
- ・ 深く大きい呼吸、意識障害（時に昏睡）、手足の震え〔ケトアシドーシス〕
- ・ 意識が完全に消失〔高浸透圧性昏睡〕
- ・ 激しい上腹部の痛み、腰背部の痛み、発熱、吐き気、嘔吐〔急性膵炎〕

**以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。****保管方法その他**

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

**医療担当者記入欄** 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。