

くすりのしおり

622014501
2010年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入

主成分：モメタゾンフランカルボン酸エステル（Mometasone furoate）

剤形：白色の定量式吸入用散剤、（容器）白色、（下部）ピンク色

シート記載：



この薬の作用と効果について

合成副腎皮質ステロイドで、抗アレルギー作用や抗炎症作用があり、気管内吸入で気道の炎症を抑えて、喘息発作を起りにくく、軽くします。

通常、気管支喘息の治療に用いられます。ただし、すでに起きてしまった発作を速やかにしずめる薬ではありません。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用し、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。感染症、全身の真菌症、結核がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> **：医療担当者記入**
- ・ 通常、成人は1回主成分として100 μ gを1日2回吸入します。年齢・症状により適宜増減されますが、原則として1日の最大吸入量は800 μ gが限度とされています。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 使用する時は携帯袋および使用説明書をよく読んで使用してください。
- ・ 吸入後はできるだけうがいをしてください。うがいができない場合は口をすすいでください。
- ・ この薬の吸入回数は60回です。それ以上は自動的に容器がロックされ、使用できません。
- ・ 使い忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く、忘れた1回分を吸入してください。ただし、次に吸入する時間が近い場合は、吸入せずに次の分から指示されたとおりに吸入してください。絶対に2回分を一度に吸入してはいけません。
- ・ 誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 喘息の症状が悪化した場合は、すぐに担当の医師に連絡してください。
- ・ ほかの医療機関にかかったり薬局で薬を買うときはこの薬を使用していることを必ず伝えてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、口腔カンジダ症（口の中に白い苔ができる）、嗄声（しゃがれ声）、咽喉頭症状（不快感、痛み、乾燥）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 呼吸困難、血管浮腫（目や口のまわりの腫れ）、じんましん〔アナフィラキシー様症状〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 防湿のため、使用時以外、キャップをきちんとしめておいてください。吸入器が汚れたときは乾いた布やティッシュペーパーで清潔にし、吸入器は洗わないでください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

※次ページも必ずお読みください。

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。