

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ニューロタン®錠 100mg

主成分：ロサルタンカリウム（英名 Losartan potassium）

剤形：白色の錠剤、長径 11.0mm、短径 7.5mm

シート記載：ニューロタン 100mg、100mg



この薬の作用と効果について

アンジオテンシン II 受容体拮抗作用により、血圧を下げる薬です。

また、血圧を下げる作用とは別に蛋白尿を減らすなど腎臓を保護し、腎機能の悪化を抑える働きがあります。通常、高血圧症の治療に用いられます。

高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症の治療にも用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝臓や腎臓がわるい、脳血管障害（脳卒中など）を起こしたことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は

：医療担当者記入

- ・高血圧症の治療に使用する場合、通常、成人にはロサルタンカリウムとして 25～50mg を、1 日 1 回服用しますが、年齢、症状により適宜増減し、100mg まで増量できます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症の治療に使用する場合、通常、成人には 1 回 50mg を、1 日 1 回服用しますが、血圧値により適宜増量し、100mg まで増量できます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に通常服用する時間が近い場合は飲まずに次の服用時間から 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・この薬は血圧低下によるめまい、ふらつきなどがあらわれることがありますので十分注意してください。もしその症状があらわれた時には自動車の運転、高所での作業、危険を伴う機械の操作等はしないようにしてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、めまい、嘔吐・嘔気、ほてり、高カリウム血症、低血圧、無力症／疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・蕁麻疹、呼吸困難、むくみ[アナフィラキシー様症状]
- ・顔・唇・舌・のどがはれる[血管浮腫]
- ・尿が出なくなる、尿が減る、全身のむくみ[腎不全]
- ・寒気、吐き気、気を失う[ショック、失神、意識消失]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

湿気を避けて保存してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。