

くすりのしおり

660432002
2010年8月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：トルソプト点眼液 0.5%

主成分：ドルゾラミド塩酸塩（Dorzolamide hydrochloride）

剤形：無色澄明の点眼剤、（キャップ）淡い黄色の三角形、（点眼瓶）白色半透明、（投薬袋）淡い黄色

シート記載：



この薬の作用と効果について

炭酸脱水酵素阻害作用によって房水の産生を減らすことにより、眼圧を下げ、緑内障による視野の悪化を抑えます。

通常、緑内障、高眼圧症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝臓または腎臓の病気がある。コンタクトレンズを使用している。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は**◀ : 医療担当者記入▶
- ・ 通常、0.5%製剤を1回1滴、1日3回点眼します。なお、十分な効果が得られない場合は、1%製剤を用いて1回1滴1日3回点眼します。必ず指示された点眼方法に従ってください。
- ・ 点眼する時は、容器の先がまぶたやまつげに触れないよう注意してください。点眼後、目を閉じ1～5分間目がしらを指先で抑えてください。ほかの目薬も使う場合は、はじめの目薬を点眼してから5分以上間をあけてください。
- ・ 点眼を忘れた場合は、気がついた時にすぐに1回分を点眼してください。ただし、次に通常点眼する時間が近い場合は点眼せずに、次の点眼時間から1回分を点眼してください。2回分を一度に点眼してはいけません。
- ・ 誤って多く点眼した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で点眼するのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、しみる、結膜充血、目がかすむ、頭痛、吐き気などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 発熱、粘膜の発赤・びらん、紅斑 [皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、投薬袋にいれ、高温を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。