

プレバイミス®を服用される患者さんとお家族へ

監修：長尾 美紀 先生 京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学 教授

プレバイミス®はサイトメガロウイルス(CMV)感染症の 発症を抑えるお薬です お薬の服用中だけでなく、服用が終わった後も、 体調の変化にご注意ください

全身症状



- 発熱(38℃以上)
- 体がだるい
- やる気がでない
- 関節痛・筋肉痛

消化器



- 吐き気
- 嘔吐
- 腹痛
- 下痢
- 血便を含む
肛門からの出血

肺



- 呼吸がしづらい

眼




- 視力低下

こんな症状はありませんか?気になる時はすぐに受診・相談を

医療機関名

プレバイミス®服用終了後のCMV感染症発症リスク



Q

お薬の服用が終わった後も、体調の変化に気を付けなければならないのはなぜですか？

A

ご自身の免疫機能が回復していれば、CMVが増えることを抑えることができます。しかし、お薬の服用が終わった直後は、ご自身の免疫機能がまだ十分に回復していない時期にあたる可能性があります。この時期はCMV感染症を発症する恐れもあるため、お薬の服用が終わった後も体調の変化に注意してください。

移植後の体調を安定させるためには、処方されたすべてのお薬を指示通りに服用することが非常に重要です。ご自身の判断で飲むのを止めたり量を加減したりせず、医師や薬剤師の指示をしっかりと守って、一緒に治療を続けていきましょう。

