

プレバイミズ[®]錠240mgを 服用される方へ

<同種造血幹細胞移植を受けた患者さん向け>



MSD製薬
INVENTING FOR LIFE

Q

プレバイミス[®]錠は どのようなお薬ですか？

A

プレバイミス[®]錠は、同種造血幹細胞移植を受けた患者さんが移植後合併症の1つであるサイトメガロウイルス(CMV)感染症の発症を抑制するために、CMVが活発化(再活性化)するのを予防するお薬です。

プレバイミス[®]錠の服用方法

のむ量やのみ始めるタイミングは、
あなたの状態などにあわせて医師が決めます。

移植当日～移植後28日以内を目安にのみ始め、のみ続ける期間については
主治医の指示を守ってください。

1日1回決められた量を
のんでください



コップ1杯程度の水またはぬるま湯で
のんでください。





プレバイミス[®]錠をのむ際の注意事項は何ですか？

A

プレバイミス[®]錠をのむ際は、以下のことにご注意ください。

- お薬は必ず、PTPシートから取り出してのんでください。



- 自己判断で使用を中止したり、のむ量を変更したりしないでください。

のむ量を変えると、お薬の効果が得られないことがあります。主治医の指示どおりにのみ続けることが重要です。

昨日のみ忘れた分も
いっしょにのもう

- のみ忘れても、決して2回分を一度にのまないでください。

のみ忘れに気がついた時に、すぐに1回分をのんでください。ただし、次のお薬をのむ時間が近い場合は、1回とばして、次の時間に1回分のんでください。



- 誤って多くのんだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

- 主な副作用として、吐き気、下痢、嘔吐などが報告されています。このような症状に気づいたら、医師または薬剤師に相談してください。

Q

サイトメガロウイルス(CMV)って どんなウイルスですか?

A

サイトメガロウイルス(CMV)はヘルペスウイルスの一種です。どこにでもいるウイルスで、日本人の60~90%¹⁾がいつのまにか感染しています(初感染)。感染しても、健康な状態では症状が出ないのが特徴です。

1) 日本造血・免疫細胞療法学会：造血細胞移植ガイドライン-ウイルス感染症の予防と治療
サイトメガロウイルス感染症（第5版補訂版），2024



サイトメガロウイルス(CMV)

日本人のほとんどが
乳幼児期に
感染しています



元気なひとは
感染しても
何も起きません




CMVに感染すると どんな影響がありますか？

A

CMVに一度感染すると、生涯体内からなくなることはありませんが、健康な状態では症状が出ないことがほとんどです。ただし、移植などで体の免疫力が低下すると、体内に潜んでいたCMVが再び活動を始めます（再活性化）。

再活性化した状態を何も治療せず放っておくと、感染症を引き起こし、さまざまな症状があらわれます。



CMV感染症の症状

CMVはさまざまな臓器にあらわれるため、CMV感染症の症状は多彩です。発症時期は、移植後3～12週が多いといわれています。

主な症状

全身症状	発熱(38°C以上)・体がだるい・やる気がでない・関節痛・筋肉痛
肺	呼吸がしづらい
消化器	吐き気・腹痛・嘔吐・下痢・血便を含む肛門からの出血
眼	視力低下



Q

CMV再活性化を 予防する意義は何ですか？

A

同種造血幹細胞移植後にCMVが再活性化すると、移植後の健康状態に悪影響を与えることがわかつてきました。

移植後の負担を減らすためにも、CMVの再活性化を予防することが重要です。



CMV再活性化を しっかり予防するためには お薬をきちんとのみ続ける ことが大切です



プレバイミス[®]錠は、CMVの再活性化を予防することでCMV感染症の発症を抑制します。予防薬全般にいえることですが、症状を出さないことが役割なので、お薬をのむことで状態がよくなったり、何かの症状が治まるといったことがないため、お薬の効果がわかりにくいくかもしれません。だからといって、ご自身の判断でお薬をのむことを中断したり、のむ量を調節してしまうと、予防効果がきちんとあらわれなくなってしまいます。医師や薬剤師の指示をしっかり守り、きちんとのみ続けてください。



何か気になることがある場合は、
すぐに医師や薬剤師などの医療従事者に相談してください。

次のようなときはのみ始める前に 医師・薬剤師にご相談ください



重度の肝機能障害がある



お薬をのんで
アレルギー症状が出たことがある



妊娠している、または
妊娠している可能性がある



授乳中



ほかにもお薬をのんでいる

医療機関名